



Insistența negilor pelvini

Lector Dr. Ciprian Pop-Began

Condiloamele acuminat

- Cunoscut ca și negi genitali reprezintă manifestările cutanate ale infecției cu Human Papilloma Virus cu troficitate epidermală.
- Tulpinile cu tropism epidermal = tulpinile cu risc scăzut de cc cervical
- Mai mult de 180 de tulpini identificate
- Mai mult de 90% condilomatoze - tulpinile 6 și 11

Fiziopatologie

- Celulele stratului bazal epidermal sunt atacate de tulpinile HPV
- Străbat straturile superficiale provocând micro-abraziuni
- Faza latentă asimptomatică – luni → ani de zile
- Faza latentă → transformarea celulelor normale în koilocite ale condiloamelor acuminat

Localizare

- Localizări comune:

- Penis
- Vulvă
- Vagin
- Cervix
- Perineu
- Zona peri-anală

- Localizări non-uzuale:

- Orofaringe
- Laringe
- Trahee
- Extremități

Incidență

- Age 14-59 years - 26.8%
- Age 14-19 years - 24.5%
- Age 20-24 years - 44.8%
- Age 25-29 years - 27.4%
- Age 30-39 years - 27.5%
- Age 40-49 years - 25.2%
- Age 50-59 years - 19.6%

Factori favorizanți

- Fumatul
- Contraceptivele orale
- Parteneri multipli
- Debutul timpuriu al vieții sexuale
- Ne-
- purtarea măștii chirurgicale în microchirurgie

Manifestări clinice

- Leziune singulară sau multiplă de tip papilomatos apărută în zonele descrise
- De cele mai multe ori erupția nu este însoțită de prurit, în măsura în care nu se asociază cu alte BTS
- Disconfort estetic în principal, afectarea extremităților poate fi însoțită de durere la locul de dezvoltare al condilomului

Prognostic

- în general favorabil
- 20% asociază BTS
- se raportează funcție de statusul imun
- dependent de complianța conduitei terapeutice

Prognostic

- Anal cancer - 90%
- Vulvar cancer - 40%
- Vaginal cancer - 40%
- Oropharyngeal cancer - 12%
- Oral cancer - 3%

Management

- Educație sexuală
 - Vaccinare
- Terapia leziunilor
- Modulare imună

Terapia leziunilor

- Crio-terapia
- Electro-terapia
- Excizia chirurgicală a leziunilor
- Ablația laser cu dioxid de carbon

Vă mulțumesc!