




Cum sa fii pregatit pentru reactii adverse postvaccinare

Dr. Brinzei Diana

- Ca orice medicament, si vaccinul poate cauza reactii adverse.
- Solicitati un consult medical de urgență dacă aveți simptomele unei reactii alergice severe.



- Trusa de urgență=instrument obligatoriu!!!




Reactii adverse posibile

- Senzatie de lesin;
- Febra sau subfebrilitate;
- Frison;
- Cefalee;
- Stare de rau;



Reactii adverse posibile-soc anafilactic?



Reactii adverse posibile-eruptie tegumentara



Reactii adverse extrem de frecvente

- Dureri locale;
- Sensibilitate;
- Tumefactie sau inrosire la nivelul locului de administrare a vaccinului;
- Adenopatie locala;
- Dureri articulare sau musculare;



Reactii adverse

- Greata;
- Varsaturi;
- Dureri abdominale;
- Inapetenta;
- Transpiratii;



Trusa de urgență


- Epipen/Adrenalină;
- Analgezic local;
- Antitermic;
- Solutii perfuzabile;
- HHC, Dexametazona;
- Antihistaminice;
- Medicatie simptomatica
(antivomitive, anxiolitice,
hipotenzoare);



Pacientii aflati sub tratament anticoagulant

- SE VOR VACCINA!!!
- Pacientii sub Eliquis, Pradaxa, Xarelto se pot vaccina fara sa intrerupa anticoagulantul;
- Se va mentine pansament compresiv local peste 2 minute post vaccinare;
- Pacientii sub Sintrom sau Trombostop trebuie sa aiba INR<3!

MULTUMESC!



Considerati utila vaccinarea in etapa a 3-a a adolescentilor(14-18 ani)?

DA

NU