



Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Dr. Lelia Iliescu
Medic primar ATI
Doctor in medicina

Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?



Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Consultul preanestezie



Recomandări actualizate:


- Recomandăm includerea informațiilor perioperatorii în fiecare consult preanestezie deoarece este foarte important pentru pacienți (1B)
- Recomandăm eforturi în îmbunătățirea abilităților de comunicare ale clinicienilor (1B)

Eur J Anaesthesiol 2018; 35:407–465

Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Consultul preanestezic (DE) NOTA 10!



1. anamneza: boala curentă; alte boli și evaluarea tuturor organelor și sistemelor cu interes deosebit asupra funcției cardiace, funcției pulmonare și endocrine. Se notează nivelul de anxietate;
2. istoric al medicamentelor cu interes deosebit asupra  Aspirina > 200 mg/zi și Triflusal > 300 mg/zi oprire 3 zile, Ticagrelol 5 zile, Clopidogrel oprire 5-7 zile, Prasugrel oprire 7 zile, Apixaban/Rivaroxaban 72h, Dabigatran oprire 72h la cei cu funcție renală bună, Enoxaparina, alte HGMM oprire 24h, Fondaparinux 4 zile, Trombostop 3 zile. AntiHTA oprire (doar beta-blocant se ia), suplimentele Ginkgo biloba, Ginseng, usturoi și IMAO, se intrerup 2 săptămâni;
Eur J Anaesthesiol 2022; 39:100–132
3. alergii medicamentoase, coloranți, substanțe de contrast;
4. anestezii precedente, antecedente heredocolaterale anestezice;

Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Consultul preanestezic (DE) NOTA 10!



5. examen fizic general și specific anestezic;
6. investigații realizate (HLG, coagulograma, glicemie, uree, creatinina, TGO, TGP, Na, K, ECG, ecografie) și propuneri (ex: bilant bacteriologic pentru ulcerul varicos);
7. tipul intervenției chirurgicale;
8. evaluarea riscului anestezic pe scala ASA;
9. stabilirea tipului anesteziei și utilizarea celor mai bune resurse disponibile pentru scăderea riscului anestezic;
10. obținerea "Acordului pacientului informat".

Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Recomandări

- Profilaxia TVP cu 12 ore preoperator
- Pregătirea medicației personale – în cutii originale
- Repaos alimentar preoperator: mâncare solidă 6 ore, cafea cu lapte 4 ore, apă 2 ore
- Premedicație – nu se recomandă în cazul spitalizării de zi
- Profilaxia antibiotică perioperatorie
 - orală cu 12 ore anterior intervenției chirurgicale: Ampicilina 2 g
 - intravenoasă cu 60 minute înaintea inciziei: Cefazolina 2 g doză unică (Ghid național prevenire AMR si IAAM 2021)

Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Tipuri anesteziei

- Locala + Sedare
 - Avantaje (recuperare precoce, confort)
 - Dezavantaje -
- Neuraxială
 - Avantaje (lipsa durerii PO)
 - Dezavantaje (cefalee 5-10%, simptome neurologice tranzitorii)
- Generală
 - Avantaje (recuperare precoce, confort)
 - Dezavantaje (necesar crescut analgezie PO , spitalizare prelungita)



Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?

Postoperator

- Prevenirea și tratamentul durerii postoperatorii se realizează prin analgezie balansată sau multimodală folosind acetaminofen, antiinflamatorii nesteroidiene, opioide;
- Tratament GVPO polimodal;
- La persoanele vârstnice este importantă profilaxia declinului cognitiv postoperator prin evitarea hipovolemiei, reluarea alimentației enterale, evitarea zgomotelor și facilitarea unui somn bun, mobilizare precoce, facilitarea orientării (aparatură auditivă, ochelari, ceas) și terapie adecvată a durerii;
- Reluarea antiagregantelor și anticoagulantelor (Aspirina, Triflusal, Clopidogrel 6h PO, Ticagrelol, Prasugrel 24h PO, Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran 24h PO, Enoxaparina, alte HGMM, Fondaparinux, Trombostop 24h PO);
- Profilaxia TEV timp de 7 zile, începând cu 8h PO;
- Pacienții trebuie avertizați că nu pot conduce sau nu pot lua transportul în comun spre casă și au nevoie de o persoană responsabilă care să îi îngrijească timp de 24 h.

Unde se poziționează anestezistul în echipa care îngrijește persoana cu BVC ?



Catetere hemodializa temporara
(termen scurt)



Catetere hemodializa long life /tunelizate
se pastreaza pana la 1 an daca sunt
ingrijite corect destinate pacientilor cronici



Cateter venos central



ÎNTREBĂRI ???



Vă mulțumesc frumos pentru atenție!