

Primul-ajutor la copil si bebelus

Cand, unde, cu ce mijloace ?

Atat la cabinet, cat si in afara lui, pe langa patologia acuta de tip gripal, digestiv etc, ne confruntam si cu :

- Plagi
- Arsuri de diferite grade
- Convulsii
- Insuficienta respiratorie acuta, datorata obstructiei cu corpi straini, chiar si aparitia stopului respirator sau cardiac.

A, B, C

- Pentru aprecierea severitatii urgentei vom folosi si la un copil constient formula intalnita in stopul cardio-respirator, reprezentand:
 - Airway – sunt libere caile aeriene ? Daca nu, le eliberam
 - Breath – copilul respira eficient ?
 - Circulation – ar putea fi circulatia sanguina compromisa ?

Recunoasterea urgentei

- In cadrul evaluarii *primare*, linistind si incurajand apartinatorii vom obtine *informatii* privind circumstantele de timp, loc, legatura cu alimentatia, cu tratamentele efectuate, manevrele de prim-ajutor imediate aplicate.
- Apelul prin “112”, in situatiile amenintatoare de viata, furnizand informatiile preliminare
- Trusa de prim-ajutor

Arsuri

- Indepartarea hainelor
- Evaluare a profunzimii si intinderii (gradul) arsurii / interesarea zonelor “functionale” (maini, picioare, fata, perineu) /interesarea cailor aeriene/ tulburari circulatorii locale
- A, B, C
- Aplicare de apa rece local in arsuri usoare (15 minute)
- Pansament si abord vascular precoce in vederea perfuzarii/analgeziei in arsurile medii/severe
- Apel prin “112” pentru arsuri grad 2 sau mai mare

